

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十

詳校官太醫院吏目<sub>臣</sub>宋桂

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

總校官中書<sub>臣</sub>朱 鈐

校對官中書<sub>臣</sub>李 荃

謄錄監生<sub>臣</sub>唐 燦

繪圖監生<sub>臣</sub>孫大孺

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣目錄

股部

附骨疽

咬骨疽

股陰疽

橫痃疽

陰疽

伏兔疽

股陽疽

環跳疽

肚門癰

箕門癰

腿遊風

青腿牙疳

膝部

膝癰

疝疽

膝眼風

鶴膝風

下石疽

緩疽

委中毒

上水魚

人面瘡

御纂醫宗金鑑卷七十目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣

附骨疽圖



附骨疽在大腿外側漫腫胖大而腿同

咬骨疽圖



咬骨疽在大腿裏側沒腫兩腿同



股部

附骨疽 咬骨疽

附骨大股外側生在腿裏側咬骨名體虛寒濕乘虛入寒熱往來不炊紅痛甚徹骨難屈轉寒濕化熱腫胖形蒜灸起炮無炮逆潰後最忌敗漿膿

註

此二證生於大腿裏外外側屬足三陽經裏側屬足三陰經附骨疽生於大腿外側咬骨疽生於大腿裏側由體虛之人露卧風冷浴後乘涼寒濕侵

襲或房慾之後蓋覆單薄寒邪乘虛入裏遂成斯疾初覺寒熱往來如同感冒風邪隨後筋骨疼痛不熱不紅甚則痛如錐刺筋骨不能屈伸動轉經久陰極生陽寒鬱為熱熱甚腐肉為膿外形腫胖無頭皮色如常漸透紅亮一點內膿已成凡治此證初起寒熱往來覺痛時輕者即服萬靈丹重者服五積散加牛膝紅花痛處用雷火鍼鍼之發汗散寒通行經絡膿成開之潰後餘治俱按潰瘍門

又有漫腫疼痛發於尻臀部位者宜服內托羌活湯又有發於腿之裏側近膝者屬足太陰脾足厥陰肝二經部位宜服內托黃耆湯又有發於腿外側者屬足少陽膽經部位宜服內托酒煎湯又有發於腿之正面者屬陽明胃經部位頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶者宜服茯苓佐經湯又有發於腿之裏側屬太陰脾經部位骨節焮痛四肢拘急自汗短氣小水不利手足浮腫者宜服

附子六物湯又有發於腿之後面屬足太陽膀胱經部位腿足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或兼惡風頭痛者宜服麻黃佐經湯又有三陰不足外邪過盛大腿通腫皮色不變疼痛日增不消不潰者此屬虛寒骨冷急服大防風湯補虛逐寒日久消之不應者勢欲作膿外用隔蒜片灸之起炮艾爆有聲為吉灸之無炮骨中不覺熱者屬逆灸後宜服十全大補湯加牛膝羌活防已或八珍

湯加附子補托之膿成脹痛鍼之出黏白膿為順  
若出白漿水或豆汁者俱為敗漿終屬險候數證  
潰後內外治法亦俱按癰疽潰瘍門以上之證皆  
由沉寒痼冷中來外敷內服不可用苦寒損脾泄  
氣等藥犯之必至氣血冰凝內肉瘀腐日久化為  
汚水不治之證也按準繩等書云傷寒汗後餘邪  
成流注流注之壞證成附骨疽夫汗後流注易愈  
惟失治乃為壞證不能復生似不能變成附骨疽

况附骨疽係調治可愈之證若果數變之後則壞而又壞矣又豈能復有成功乎是流注壞證變成附骨之說存而不論可也

雷火神鍼

蘄艾 三錢

丁香 五分

麝香 二分

藥與艾搽和用夾紙一張將藥平鋪紙上用實力實捲如指粗大收貯臨用以紙七層平放患處將鍼

點着一頭對患向紙捺實待不痛方起鍼病甚者  
再鍼一次七日後火瘡大發其功甚效

方歌

雷火神鍼攻寒濕附骨疽痛鍼之宜丁麝二香共  
蘄艾燃鍼痛處功效奇

內托黃耆湯

黃耆

鹽水拌炒

當歸

木瓜

連翹

去心

柴胡

各一錢

羌活

肉桂

生地

黃蘗 各五分

酒水各一鍾煎一鍾空心熱服

方歌 內托黃耆歸木瓜羌柴翹桂地藥加疽生膝股肝

脾位酒水煎之服最佳

內托酒煎湯

當歸

黃耆 各二錢

柴胡 一錢五分

大力子



連翹

去心

肉桂

各一錢

升麻

黃蘗

甘草

各五分

酒水各一鍾煎一鍾食前服

方歌內托酒煎寒濕凝腿外少陽附骨生歸者大力柴

翹桂升蘗甘加酒水靈

茯苓佐經湯

白茯苓

蒼朮

米泔水炒

陳皮

白朮

土炒

半夏

各一錢  
製

厚朴

薑炒

木瓜

柴胡

藿香

澤瀉

葛根

甘草

各五分

生薑三片水二鍾煎八分食前服

方歌茯苓佐經足陽明腿面焮疼煩熱乘平胃木瓜柴

朮半夏瀉加薑葛引經

附子六物湯

附子

甘草 各一錢

防己

白朮

土炒

白茯苓

各八分

桂枝

五分

生薑三片 水二鍾 煎八分 食遠服

方歌 附子六物風寒濕流注脾經須服之四肢拘急骨

節痛防己朮甘苓桂枝

麻黃佐經湯

麻黃

蒼朮

米泔水浸炒

防風

防己

羌活

白茯苓

葛根

各一錢

桂心

甘草

生

細辛

各五分

生薑三片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食前服

方歌麻黃佐經足太陽風寒濕注本經傷蒼朮二防羌

活桂苓甘細葛棗生薑

大防風湯

人參 二錢

防風

白朮

土炒

黃耆

牛膝

杜仲

當歸

熟地

白芍

酒炒

川芎

羌活

甘草

附子

製 各一錢

生薑三片水二鍾煎八分食前服

方歌

大防風療寒邪傷附骨疽腫色如常參朮黃者牛

膝仲四物羌甘附子薑

萬靈丹

方見腫瘍門

內托羌活湯

方見醫部上馬癰

隔蒜灸法

方見首卷灸法

十全大補湯

八珍湯

俱見潰瘍門


五積散

見内癰部  
腎癰





股 陰 疽 圖



股陰疽在股內腎囊之側左右同

股陰疽

股陰疽發大股中陰囊之側堅腫疼七情不和憂憤致潰後纏綿功難成

註

此證一名赤施發生於股內合縫下近陰囊之側因偏在厥陰經故名大股也堅硬漫腫木痛由七情不和憂思憤鬱凝結而成因在陰經起長潰膿俱屬遲緩潰後尤見纏綿收斂成功者甚少初起與附骨疽治法同腫潰俱按癰疽腫瘍潰瘍門

橫 疔 疽 圖



橫疔疽在左腿夾縫摺紋中形長如蛤

陰疽圖



陰疽在右腿夾縫損紋中形長如蛤

橫疔疽 陰疽

橫疔疽左陰疽右股內合縫腫硬疼痛牽掣九長蛤樣  
三陰七情鬱滯凝

註此二證俱生股內合縫摺紋間左為橫疔疽右為

陰疽屬三陰經由七情鬱滯凝結而成漫腫堅硬  
時疼甚則痛牽掣九上及少腹形長如蛤一兩月  
方能潰破其膿深可知破後膿稠可愈敗漿最難  
斂口久必成漏初治同附骨疽潰按癰疽潰瘍門

若膿水淋瀝日久有生蟲者形類虻蟲亦係膿深  
鬱久之所化也屬逆

伏兔疽圖



伏兔疽在大腿正面用力肉高處兩腿同

伏兔疽


伏兔穴處忌生疽腫硬鍼灸不相宜疼痛徹心寒熱作胃火毒滯潰難醫

註

經云伏兔不宜生瘡蓋伏兔乃胃經穴道在膝蓋之上六寸正中用力大如掌一堆高肉處禁用鍼灸始發寒熱交作疼痛徹心由胃火毒滯而成潰後最難收斂初治同附骨疽潰按潰瘍門




股 陽 疽 圖



股陽疽在腿外側胯尖骨之后左右同

環跳疽圖



環跳疽在環跳穴漫腫脣脰俱胖左右同

股陽疽 環跳疽

股陽疽生股外側內搏於骨不變色環跳疽腫腿難伸  
俱由風濕寒凝結

註 股陽疽生於股外側腓尖之後其毒內搏骨節膿

深至骨故漫腫不變色也環跳疽生腓骨節間之  
環跳穴所以腰難屈伸漫腫隱痛也此二證皆由  
風濕寒凝結而成屬足少陽膽經初起宜服黃狗  
下頰方更刺委中穴出黑血其腿即能轉動若漫

腫大痛者俱宜服內托黃者湯痛而筋攣者萬靈丹汗之痛止換服神應養真丹徧身走注作痛兩脚面胖腫者亦服萬靈丹汗之痛止則宜服大防風湯倍加參朮歸耆等藥宣消之若時時跳痛將潰宜托裏透膿湯服之潰後膿清稀者宜十全大補湯加牛膝外以豆豉餅灸之瘡口紫陷者十全大補湯加附子服之外換附子餅灸之食少者胃弱也諸虛皆稟於脾胃宜香砂六君子湯減去砂

仁加當歸服之俟胃口強盛仍服十全大補湯潰而反痛者氣血虛也治宜峻補始終外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但環跳疽潰破多成踵疾

### 黃狗下頰方

#### 黃狗下頰

連舌皮毛劈下入罐內鹽泥封固鐵蓋蓋口煨一炷香覺烟清即止務宜存性取出色黑如炭為度若帶白色其性已過則無用矣用時研極細末用下頰宜於屠家已殺者製用若生取特殺恐反招不祥

### 豌豆粉

#### 白歛末

三味各等分共和勻每服五錢溫黃酒空心調服  
外以此藥用香油調敷患處服藥之後出臭汗及  
熟睡為準

方歌黃狗下頰連舌皮入罐泥封火煨宜豌豆粉研加

白欵酒調臀腿疽盡醫

內托黃耆湯

大防風湯

俱見附骨疽

萬靈丹

見腫瘍門

神應養真丹

見頭部遊風

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

十全大補湯

香砂六君子湯

俱見潰瘍門


附子餅

見首卷灸法





肚 門 癰 圖



肚門癰在大腿肚左右同

箕門癰圖

箕門癰在大腿東側左右同



肚門癰 箕門癰

肚門癰在股肚生股內近膝箕門癰二證紅腫焮熱痛  
膀胱脾經濕熱成

註此二證俱屬濕熱凝結而成肚門癰生於大腿肚  
屬足太陽膀胱經箕門癰生於股內近膝屬足太  
陰脾經初起紅腫焮痛者宜服神授衛生湯若焮  
腫便秘煩躁飲冷齷數者熱淫於內也宜內疎黃  
連湯或雙解貴金丸下之若腫痛寒熱齷沉而無

力胸腹脹滿飲食如常者宜服檳蘇散如腫痛寒熱已止即換服逍遙散若腫痛色不變寒熱食少體倦者由肝虛濕痰下注也宜補中益氣湯加茯苓半夏芍藥服之若患此入房腫硬二便不通者宜六味地黃丸加牛膝車前俟二便通利仍服補中益氣湯餘治按癰疽腫瘍潰瘍門

檳蘇散

檳榔

紫蘇

香附

木瓜

陳皮

大腹皮 各一錢

羌活 五分

木香 三分

生薑三片葱白三寸水二鍾煎一鍾空心服

方歌 檳蘇腹脹氣不舒股內箕門癰可除香附木瓜陳

大腹木香羌活檳榔蘇

神授衛生湯

內疎黃連湯

雙解貴金丸

俱見腫瘍門

逍遙散

見背部上搭手

補中益氣湯

見潰瘍門

六味地黃丸

見面部雀斑

腿遊風圖

腿遊風在兩腿忽裏忽外或上或下不定色紅焮痛



腿遊風

腿遊風在遠腿生赤腫如雲焮熱疼榮衛風熱相搏滯  
宜砭出血雙解清

註

此證兩腿裏外忽生赤腫形如堆雲焮熱疼痛由  
榮衛風熱相搏結滯而成凡遇此證先施砭石放  
出惡血隨服雙解通聖散次以當歸拈痛湯清解  
治之外貼牛肉片以拔風毒甚效

當歸拈痛湯



當歸

羌活

茵陳蒿

蒼朮

米泔水浸炒

防風

各一錢

苦參

白朮

土炒

升麻

各七分

葛根

澤瀉

人參

知母

黃芩

豬苓

甘草

各五分

黃蘗

三分

水二鍾煎八分食前服

方歌

當歸拈痛腿遊風羌活人參二朮升茵陳葛草苓

知藥苦參風瀉共豬苓

雙解通聖散

見唇部唇風

青 腿 牙 疔 圖



青腿牙疔先從兩腿起形如雲分色紫  
黑大小不一其毒上攻牙齦腐爛如疔

青腿牙疳

青腿牙疳何故生只緣上下不交通陽火炎熾陰寒閉  
凝結為毒此病成青腿如雲茄黑色疲頑腫硬履難行  
牙疳齧腫出臭血穿破腮唇腐黑齒

註

此證自古方書罕載其名僅傳雍正年間北路隨  
營醫官陶起麟頗得其詳畧云軍中凡病腿腫色  
青者其上必發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發  
青腿二者相因而至推其原皆因上為陽火炎熾

下為陰寒閉鬱以至陰陽上下不交各自為寒為熱各為凝結而生此證也相近內地間亦有之邊外雖亦有不甚多惟內地人初居邊外得此證者竟十居八九蓋中國之人本不耐邊外嚴寒更不免坐卧濕地故寒濕之疾生於下致腿青腫其病形如雲片色似茄黑肉體頑硬所以步履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其熱與濕合蒸瘀於胃毒火上薰致生牙疳牙齦腐腫出血若

穿腮破唇腐爛色黑即為危候邊外相傳僅有令服馬乳之法麟初到軍營診視青腿牙疳之證亦僅知投以馬乳閱歷既久因悟馬腦之力較馬乳為效倍速令患者服之是夜即能發出大汗而諸病減矣蓋腦為諸陽之首其性溫煖且能流通故耳兼服活絡流氣飲加味二妙湯宣其血氣通其經絡使毒不得凝結外用砭法令惡血流出以殺毒勢更以牛肉片貼敷以拔出積毒不數日而愈

蓋黑血出則陰氣外泄陽氣即隨陰氣而下降兩  
相交濟上下自安也由是習為成法其中活者頗  
多因不敢自私著之於書以公於世並將所著應  
驗諸方備詳於後

### 服馬乳法

治青腿牙疳用青白馬乳早午晚隨擠隨服甚效如  
無青白馬雜色馬亦可

### 服馬腦法

治青腿牙疔用馬腦子一個用竹刀挑去筋膜放在  
盃內先將馬腦攪勻再用滾黃酒沖服或一觔或半  
觔俱可倘一次不能服盡分作二次沖服亦可

活絡流氣散

一名和中既濟湯

蒼朮

木瓜

羌活

附子

生

山查肉

獨活

懷牛膝

麻黃

各二錢



黃蘗

烏藥

乾薑

檳榔

枳殼

各一錢五分  
麩炒

甘草

黑豆四十九粒生薑三片水四鍾煎一鍾服渣水

三鍾煎八分

如牙疳盛減去乾薑附子加胡黃連二錢龍膽草

二錢

如牙疳輕而腿疼重加肉桂二錢

如寒熱已退減去羌活麻黃加威靈仙二錢五加皮二錢

方歌活絡流氣去風強青腿牙疳初服良除濕清胃通

經絡加減臨時莫執方蒼朮木瓜羌附子山查獨膝藥麻黃烏藥乾薑榔枳草引加黑豆與生薑

加味二妙湯

黃蘗生

蒼朮

米泔浸炒

牛膝 各三錢

檳榔

澤瀉

木瓜

烏藥

各二錢

當歸尾

一錢五分

黑豆四十九粒生薑三片水三鍾煎一鍾渣水二  
鍾半煎八分

方歌加味二妙行步難青腿牙疳齩腫宣藥蒼牛膝歸  
榔瀉木瓜烏藥豆薑煎

砭刺出血法

此方用三棱扁鍼形如錐挺者向腿之青黑處勿論

穴道量黑之大小鍼一分深或十鍼二十鍼俱可務令黑血流外以牛肉割片貼鍼眼並黑處次日再看如黑處微退仍鍼仍貼如無牛肉當頂刺破用罐拔法

搽牙牛黃青黛散

牛黃

青黛 各五分

硼砂 二錢

硃砂

人中白 散

龍骨 各一錢

冰片

三分

共研細末先以甘草湯將口漱淨再上此藥

方歌牛黃青黛散 硼砂冰片硃砂中 白加龍骨共研為

細末牙疳腫腐此藥搽

一方用煮馬肉湯燙洗

一方用羊肝割片貼黑處

一方用芥菜子搗麩燒酒調敷黑腫處

青腿牙疳不治證

一形氣衰敗飲食不思者不治

一牙齒俱落紫黑流血腐潰穢臭者不治

一腿大腫腐爛或細乾枯者不治

膝 癱 圖



膝癱生在膝蓋紅腫若同疽亦生在膝不紅漫腫

膝部

膝癰 疔疽

膝癰焮腫色紅疼疔疽如癰色不紅宣軟為順堅硬逆  
脾腎肝經邪所乘

註

膝癰生於膝蓋色紅焮腫疼痛屬氣血實疔疽亦  
生在膝蓋腫大如癰其色不變寒熱往來屬氣血  
虛宣軟為順堅硬如石者為逆經云肉之小會為  
谿谿者二肘二膝四腕也凡脾病在谿腎有邪其



氣留於兩膝凡筋病皆屬於節筋乃肝之餘故又屬肝是以谿會有病皆從脾腎肝三經邪氣乘之也始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門惟兩膝俱生屬敗證不可治也

欽定四庫全書

卷七十

膝眼風眼圖



膝眼風生在膝眼穴左右兩膝四穴皆同

膝眼風

膝眼風在鬼眼生疼痛如錐胖腫形下虛風濕寒侵襲  
屈伸不遂溫散靈

註

此證生於膝眼穴又名鬼眼穴在膝蓋之下左右  
兩骨空陷中由下焦素虛外邪易於侵襲先從膝  
眼隱隱作疼如風勝其痛則走注不定寒勝則痛  
如錐刺濕勝則外見胖腫屈不能伸其病在筋伸  
不能屈其病在骨動移不遂沉寒痼冷之候也惟

在臨證宜詳辨之初服萬靈丹溫散之其痛即止  
次服獨活寄生湯宣補之效遲者兼用火鍼鍼膝  
眼穴此轉重就輕之法也單膝生者輕雙膝生者  
重若左膝方愈復病右膝右膝方愈復病左膝者  
名過膝風屬險治法同前

### 獨活寄生湯

獨活

桑寄生

如無真者以  
川續斷代之

人參

茯苓

川芎

酒洗

防風

桂心

杜仲

薑汁炒去絲

牛膝

秦朮

細辛

各一錢五分

當歸

酒洗

白芍

酒炒

熟地

甘草

各一錢

生薑五片水二鍾煎七分食前服

方歌獨活寄生肝腎虛寒濕注膝腫痛居參苓四物防

風桂杜膝秦光甘細宜

萬靈丹

見腫  
瘍門





鶴膝風圖



鶴膝風其膝肿大宜腫皮色如常

鶴膝風

鶴膝風腫生於膝上下枯細三陰虛風寒濕邪乘虛入痛寒攣風筋緩濕

註此證一名遊膝風一名鼓槌風痢後得者為痢風

單生者輕雙生者最重因循日久膝腫粗大上下股脛枯細由足三陰經虛風寒濕邪乘虛而入為是病也膝內隱痛寒勝也筋急而攣風勝也筋緩無力濕勝也初腫如綿皮色不變亦無焮熱疼痛

日增無論單雙俱宜服五積散汗之次服萬靈丹  
溫散之外敷回陽玉龍膏常服換骨丹或蚬蚶丸  
以驅其邪若日久不消勢欲潰者宜服獨活寄生  
湯或大防風湯補而溫之痛甚加乳香潰後時出  
白漿浮皮雖腐腫痛仍前不可用蝕藥只宜芙蓉  
葉菊花葉各五錢研末大麥米飯拌均貼之亦可  
止疼或用豆腐渣蒸熱捏作餅貼之亦可此證係  
外證中之敗證也收功甚難

換骨丹

蒼朮

四兩

枸杞

二兩五錢

茄根

二兩  
洗

當歸

牛膝

敗龜板

防風

秦艽

獨活

萆薢

羌活

蠶沙

松節

虎骨

各一兩  
酥炙

共用酒浸曬乾研為細末酒糊為丸如梧桐子大  
每服三錢食前白滾水送下

方歌

換骨丹歸膝枸蒼龜板風朮獨薜羌蠶沙松節茄  
根虎鶴膝風生服最良

蚬螂丸

蚬螂

一箇  
即全蠍生者

白芷

桂心

安息香

阿魏

以上各用童  
便酒炒熟

威靈仙

白附子

童便酒炒

當歸

羌活

桃仁

童便酒炒

牛膝

北漏蘆

地骨皮

白芍

各一兩  
酒炒

乳香

沒藥

各七錢五分  
二味用童便酒炒

共研末煉蜜為丸桐子大每服三錢空心溫酒送下

方歌 蚘螂九治鶴膝風芷桂安息魏威靈白附歸羌桃

乳沒膝漏骨皮芍蜜成

五積散

見內癰  
部腎癰

大防風湯

見股部  
附骨疽

萬靈丹

回陽玉龍膏

俱見腫  
瘍門

獨活寄生湯

見本部  
膝眼風





下石疽圖

下石疽生在膝間形如雞卵堅硬不紅無論  
左右上下及兩膝皆同



下石疽

下石疽在膝上生堅硬如石牽筋疼皮色如常難潰斂  
證由血滯外寒凝

註

此證生於膝間無論膝蓋及左右俱可以生堅硬  
如石牽筋疼腫如鷄卵皮色不變並無焮熱難  
消難潰既潰難斂最屬疲頑由身虛寒邪深襲致  
令血瘀凝結而成腫潰內外治法俱與中石疽叅  
考但此證腫潰俱涼若涼化為熱見諸善證者始

吉仍見惡證者難痊



緩 疽 圖



緩疽生膝兩旁腫硬如鏡  
首其色紫黯兩膝皆同

緩疽

緩疽血滯外寒凝腫硬如餒膝上生紫黯潰遲多焮熱  
腫久漸腐爛皮疼

註

此證由外寒深襲血瘀凝滯而成生於兩膝上或  
生於膝兩旁腫硬如餒木痛日增其色紫黯積日  
不潰證之情形與下石疽相似惟多焮熱腫久則  
腐爛肌肉皮膚初服當歸拈痛湯以宣通濕熱次  
按中石疽治法內宜溫補外宜灸法虛甚者十全

大補湯相兼治之

當歸拈痛湯

見股部  
腿遊風

十全大補湯

見潰瘍門





委 中 毒 圖



委中毒生在腿凹木硬微紅左右皆同

委中毒

委中毒在臑紋生屈伸木硬微腫紅膽熱流入膀胱過速宜活血刺委中

註

此證生委中穴穴在膝後臑中央約紋動脈陷中即是約紋者摺紋也又名血郗穴屬膀胱經俗名腿凹經曰臑中由膽經積熱流入膀胱壅遏不行而成木硬腫痛微紅屈伸艱難治宜速用活血散瘀湯逐下惡血為效緩則筋縮而成廢疾諸書皆

云兼刺委中穴出血自消然刺穴必兼有腰痛不能轉移者方可刺之即出血亦不可過多多則令人身撲面見脫色其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門亦有焮痛色赤潰速者由濕熱凝結所致治法亦按腫瘍潰瘍門

活血散瘀湯

當歸尾

赤芍

桃仁

去皮尖

大黃

各二錢  
酒炒

川芎

蘇木

各一錢五分

丹皮

枳殼

麩炒

枳萋仁

各一錢

檳榔

六分

水二鍾煎八分空心服渣再煎服

方歌

活血散瘀委中毒昏因積熱腫其處歸芍丹皮桃

枳榔枳萋大黃芎蘇木

上水魚圖



上水魚生在腿凹指紋兩稍腫如高瘦長如魚形色紫左右皆同

上水魚

上水魚生委中旁摺紋兩稍疼埂昂長若魚形瘀熱結外施砭血敷二黃

註

此證生委中摺紋兩稍腫如高埂長若魚形色紫作痛由血熱遇外寒稽留則血瘀凝結而成外用砭法向腫埂上砭出惡血兼用二黃散香油調敷甚效

二黃散

印顛倒散見鼻部肺風粉刺

人面瘡圖



人面瘡或生於肘或生於膝

人面瘡

膝肘瘡生如人面自古傳來係孽因流氣苦參敷貝母  
從善改惡自察心

註此證自古傳來乃奇病也多生兩膝或生兩肘腫  
類人形眉目口鼻皆具本事方云瘡口能飲食施  
治諸藥絕無所苦惟敷貝母其瘡皺眉閉口自此  
日用貝母末和水敷灌數日瘡消結痂而愈又諸  
書皆以為素積冤譴須自清心懺悔初宜服流氣



飲日久宜用大苦參丸今據所用之藥俱係辛熱  
疎散之品其證或因風寒濕三氣凝合之所化亦  
未必盡由冤譴所致也依古施治諒可奏效

大苦參丸

苦參

二兩

蔓荊子

赤茯苓

山藥

白芷

荊芥

防風

白附子

川芎

山梔

生

何首烏

白茯苓

皂角

川烏

炮

黃耆

赤芍

獨活

羌活

各五錢

草烏

一錢五分  
炮

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服五七十九  
空心黃酒送下不飲酒者以茶代之

方歌

大苦參丸人面瘡蔓荈山藥芷荆防白附芎藭何  
疾皂川草烏者芍獨羌

流氣散

方見背部  
痰注發

乾薑 附子 白朮 芍藥 羌活 獨活 川椒 皂莢 甘草 芎藭 何首烏 蔓荈 山藥 芷 荆 防 白 附 芎 藭 何

御纂醫宗金鑑卷七十